

Table 1. Setul de trăsături utilizate la clasificarea vorbitorilor în vorbitori cu dentiție normală și vorbitori cu patologii de dentiție (0=normal, 1=patologic), pentru vorbitorii de gen masculin.

Nr. vorbitor	p(C1)	p(C2)	p(C3)	p(C4)	p(C5)	p(C2 <i>i</i>)	Diagnostic
1	0.20	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0
2	0.05	0.40	0.25	0.30	0.00	0.50	0
3	0.21	0.00	0.68	0.11	0.00	0.00	1
4	0.00	0.05	0.85	0.10	0.00	0.00	0
6	0.30	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0
7	0.16	0.21	0.11	0.53	0.00	0.25	0
8	0.37	0.11	0.21	0.32	0.00	0.50	0
9	0.30	0.30	0.20	0.20	0.00	0.33	0
10	0.10	0.05	0.35	0.50	0.00	0.00	0
11	0.05	0.05	0.50	0.40	0.00	0.00	0
12	0.10	0.15	0.65	0.10	0.00	0.33	0
13	0.40	0.05	0.40	0.15	0.00	0.00	1
14	0.10	0.05	0.40	0.45	0.00	1.00	0
15	0.60	0.10	0.15	0.15	0.00	0.50	0
16	0.16	0.11	0.26	0.47	0.05	0.00	1
17	0.47	0.00	0.32	0.21	0.05	0.00	1
18	0.15	0.05	0.75	0.05	0.00	1.00	1
19	0.20	0.10	0.60	0.10	0.00	0.50	1
20	0.15	0.10	0.70	0.05	0.00	0.00	1
21	0.10	0.05	0.50	0.35	0.00	0.00	1
22	0.20	0.00	0.75	0.05	0.00	0.00	0
23	0.10	0.10	0.30	0.50	0.00	0.00	0
24	0.60	0.15	0.10	0.15	0.00	0.00	1
25	0.33	0.06	0.56	0.06	0.10	0.00	1
26	0.30	0.00	0.65	0.05	0.00	0.00	1
27	0.30	0.10	0.50	0.10	0.00	0.50	0
28	0.05	0.25	0.45	0.25	0.00	0.60	0
29	0.05	0.00	0.75	0.20	0.00	0.00	1
30	0.16	0.11	0.53	0.21	0.00	0.50	0
31	0.40	0.05	0.25	0.30	0.00	0.00	1
32	0.20	0.15	0.30	0.35	0.00	0.00	0
33	0.10	0.00	0.60	0.30	0.00	0.00	1
34	0.11	0.11	0.79	0.00	0.00	0.00	1

Table 2. Setul de trăsături utilizate la clasificarea vorbitorilor în vorbitori cu dentiție normală și vorbitori cu patologii de dentiție (0=normal, 1=patologic), pentru vorbitorii de gen feminin.

Nr. vorbitor	p(C1)	p(C2)	p(C3)	p(C4)	p(C5)	p(C4 i)	Diagnostic
1	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.70	1
2	0.21	0.11	0.53	0.16	0.05	1.00	0
3	0.05	0.15	0.30	0.50	0.00	0.60	1
4	0.05	0.05	0.60	0.30	0.00	0.83	1
5	0.11	0.05	0.63	0.21	0.00	1.00	1
6	0.05	0.15	0.30	0.50	0.00	0.50	0
7	0.15	0.00	0.45	0.40	0.00	0.88	1
8	0.60	0.10	0.15	0.15	0.00	0.67	0
9	0.15	0.20	0.40	0.25	0.00	0.80	0
10	0.15	0.05	0.55	0.25	0.00	0.80	1
11	0.15	0.10	0.45	0.30	0.00	0.83	1
12	0.05	0.05	0.47	0.42	0.05	0.63	1
13	0.05	0.05	0.55	0.35	0.00	0.86	1
14	0.05	0.05	0.75	0.15	0.00	1.00	1
15	0.00	0.05	0.45	0.50	0.00	0.60	0
16	0.00	0.24	0.59	0.18	0.15	0.67	1
17	0.05	0.11	0.53	0.32	0.00	0.83	1

Pentru antrenarea și testarea instrumentului de screening utilizat la detectarea cazurilor normale și patologice am utilizat două seturi de trăsături: p(C1)-p(C5) și p(C1)-p(C4), p(C2|i) - pentru vorbitorii de gen masculin, p(C1)-p(C4), p(C4|i) - pentru vorbitorii de gen feminin.

În cazul celui de-al doilea set de trăsături, am eliminat pronunțiile consoanei /v/ din clasa C5 și am recalculat probabilitățile p(C1)-p(C4) în mod corespunzător.